ГУБЕРНСКИЕАПТЕКИ.РФ

ОРТОПЕДИЯ | ВЫДАЧА ЗАКАЗОВ | ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК | ОПТИКА

КРУГЛОСУТОЧНОСТЬ | ВСЕ ДЛЯ ЗОЖ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВ

Каталог рецептурного производства



8 800 775 64 03

ЕДИНАЯ АПТЕЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ

ДЛЯ ВРАЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ

Рецептурно-производственные отделы АО «Губернские аптеки»

С заботой о здоровье потребителя аптечная сеть «Губернские аптеки» уже не первый год изготавливает лекарственные препараты по индивидуальному назначению врача.

Несмотря на развитие современной фармацевтической промышленности, сохраняется потребность в лекарственных препаратах с учетом индивидуальных особенностей организма. **Обращаем ваше внимание, что оснащение производственных аптек позволяет осуществлять изготовление экстемпоральных лекарственных препаратов различных объемов и дозировок.** Изготовлением на предприятии «Губернские аптеки» занимаются пять производственных аптек:

- **Аптека №4**
  г. Красноярск, ул. Декабристов, 36
- **Аптека №200**
  г. Красноярск, ул. Мичурина, 33
- **Аптека №344**
  г. Красноярск, ул. Яковлева, 59
- **Аптека №323**
  г. Красноярск, ул. имени газеты «Пионерская правда», 8
- **Аптека №330**
  г. Норильск, ул. Павлова, 19

Лекарственные средства, изготовленные в производственных аптеках, соответствуют требованиям общих фармакопейных статей, федеральных законов и приказов Министерства здравоохранения РФ по правилам изготовления и контроля качества лекарственных средств в аптеках, а также изготавливаются специалистами с фармацевтическим образованием.

Заказать изготовление лекарственных препаратов можно во всех структурных подразделениях аптечной сети «Губернские аптеки». Период получения готового препарата с момента передачи рецепта в аптеку варьируется от нескольких дней до нескольких часов в зависимости от удаленности структурного подразделения от аптеки-изготовителя.

В день обращения препарат по индивидуальному рецепту можно приобрести в аптеке №4 и аптеке №323 в Красноярске, а также в аптеке №330 в Норильске.

АО «Губернские аптеки» активно взаимодействует с медицинскими учреждениями на предмет изготовления и поставки экстемпоральных лекарственных препаратов.

Оглавление

Желудочно-кишечный тракт....4
Сердечно-сосудистая система....6
Кожные заболевания....12
Антисептики и дезинфицирующие вещества....28
Урогенитальная и половая система....34
Опорно-двигательная система....36
Нервная система....42
Респираторная система....48
Органы чувств....60
Прочие препараты....66
Ротовая полость....74



ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА



Слабительное средство



Порошок натрия гидрокарбоната



Раствор магния сульфата 33%



Слабительное средство 100 г

Эмульсия способствует размягчению каловых масс, стимулирует моторику тонкого кишечника и облегчает процесс дефекации.

Состав: масло вазелиновое 45,0; масло оливковое 30,0; масло касторовое 25,0.

Показания: острые запоры.

Способ применения: внутрь, по 15–20 мл 1 раз в сутки. Слабительный эффект наступает через 2–6 часов. Максимальный курс лечения — 3 дня.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, воспалительные процессы в брюшной полости, кишечные и маточные кровотечения, острый и хронический гломерулонефрит, нефрозонефрит, отравления жирорастворимыми ядами.

Порошок натрия гидрокарбонат 50 г

Состав: натрия гидрокарбонат.

Показания: метаболический ацидоз, изжога, неприятные ощущения в эпигастрии, различные заболевания дыхательных путей, морская и воздушная болезнь.

Раствор магния сульфата 33%

Состав: магния сульфат, вода очищенная.

Показания: запоры, холецистит, аппендицит, кишечная непроходимость, дегидратация, для зондирования.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ





Раствор дибазола 0,1%, 0,5%



Раствор калия хлорида 10%



Раствор папаверина г/х 0,1—5%



Порошок гидрохлоротиазида



Порошок карведилола



Порошок спиронолактона



Порошок дигоксина



Порошок каптоприла



Порошок силденафила



Порошок ацетилсалицило-вой кислоты



Порошок амиодарона



Порошок калия хлорида



Порошок ацетазоламида



Порошок фуросемида

Раствор дибазола 0,1%, 0,5%, 1%, 2%

Состав: дибазол, вода очищенная.

Показания: оказывает сосудорасширяющее и спазмолитическое действие, стимулирует функцию спинного мозга, расслабляет гладкие мышцы кровеносных сосудов и внутренних органов. Лечение нервных заболеваний.

Раствор калия хлорида 10%

Состав: калия хлорид, вода очищенная.

Показания: гипокалиемия различного генеза, в т.ч. обусловленная рвотой, диареей, гиперальдостеронизмом, полиурией при хронической почечной недостаточности; аритмия, в т.ч. при гликозидной интоксикации; гипокалиемическая форма пароксизмальной миоплегии.

Раствор папаверина г/х 0,1—5%

Состав: папаверин, вода очищенная.

Показания: спазмолитическое действие при повышенном мышечном тонусе.

Порошок гидрохлоротиазида

Состав: гидрохлоротиазид, лактоза/глюкоза/кальция глюконат.

Показания: для лечения артериальной гипертензии в качестве монотерапии и в комбинации с другими антигипертензивными ЛС.

Порошок карведилола

Состав: карведилол, лактоза/глюкоза/кальция глюконат.

Показания: артериальная гипертензия (монотерапия или в комбинации с другими антигипертензивными препаратами), стабильная стенокардия.

Порошок спиронолактона

Состав: лактоза/глюкоза/кальция глюконат, спиронолактон.

Показания: отеки при хронической сердечной недостаточности, цирроз печени (особенно при одновременном наличии гипокалиемии и гиперальдостеронизма), при нефротическом синдроме. Отеки во II и III триместрах беременности. Артериальная гипертензия, в том числе при альдостеронпродуцирующей аденоме надпочечников (в составе комбинированной терапии). Первичный гиперальдостеронизм.

Альдостеронпродуцирующая аденома надпочечников (длительная поддерживающая терапия при противопоказании к хирургическому лечению или в случае отказа от него). Диагностика гиперальдостеронизма. Гипокалиемия и ее профилактика при лечении салуретиками. Синдром поликистоза яичников, предменструальный синдром.

Порошок дигоксина

Состав: лактоза/глюкоза/кальция глюконат, дигоксин.

Показания: хроническая сердечная недостаточность при декомпенсированных клапанных пороках сердца, атеросклеротическом кардиосклерозе, перегрузке миокарда при артериальной гипертензии, особенно при наличии постоянной формы тахисистолической мерцательной аритмии или трепетания предсердий. Пароксизмальные наджелудочковые аритмии (мерцательная аритмия, трепетание предсердий, наджелудочковая тахикардия).

Порошок каптоприла

Состав: лактоза/глюкоза/кальция глюконат, каптоприл.

Показания: артериальная гипертензия (в т.ч. реноваскулярная), хроническая сердечная недостаточность (в составе комбинированной терапии), нарушения функции левого желудочка после перенесенного инфаркта миокарда у пациентов, находящихся в клинически стабильном состоянии. Диабетическая нефропатия при сахарном диабете 1-го типа (при альбуминурии более 30 мг/сут).

Порошок силденафила

Состав: силденафил, лактоза/глюкоза/кальция глюконат.

Показания: эректильная дисфункция различной этиологии (органическая, психогенная, смешанная).

Порошок ацетилсалициловой кислоты

Состав: ацетилсалициловая кислота, лактоза/глюкоза/кальция глюконат.

Показания: симптоматическое лечение умеренного или слабовыраженного болевого синдрома: головная боль (в том числе при абстинентном синдроме), зубная боль, мигрень, боль в горле, боль в спине и мышцах, боль в суставах, невралгия, корешковый синдром, альгодисменорея (боли при менструациях). Лихорадочный синдром при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях (у взрослых и детей старше 15 лет). Дозировка до 150 мг: при нестабильной стенокардии (внезапной боли в груди) ; при остром инфаркте миокарда (сердечном приступе); для профилактики повторного инфаркта миокарда; для профилактики тромбоза после хирургических операций и иных вмешательств на сосудах или первичного чрескожного коронарного вмешательства; для профилактики повторной транзиторной ишемической атаки и повторного инфаркта мозга.

Порошок амиодарона

Состав: амиодарон, лактоза/глюкоза/кальция глюконат.

Показания: лечение и профилактика пароксизмальных нарушений ритма: угрожающие жизни желудочковые аритмии (в т.ч. желудочковая тахикардия), профилактика фибрилляции желудочков (в т.ч. после кардиоверсии), суправентрикулярные аритмии (как правило, при неэффективности или невозможности другой терапии, особенно связанные с синдромом WPW), в т.ч. пароксизм мерцания и трепетания предсердий; предсердная и желудочковая экстрасистолия; аритмии на фоне коронарной недостаточности или хронической сердечной недостаточности, парасистолия, желудочковые аритмии у больных с миокардитом Шагаса; стенокардия.

Порошок калия хлорида 1 г; 2 г; 3 г; 7,2 г

Состав: калия хлорид.

Показания: гипокалиемия различного генеза, в т.ч. обусловленная рвотой, диареей, гиперальдостеронизмом, полиурией при хронической почечной недостаточности, приемом некоторых лекарственных средств; аритмии, в т.ч. при гликозидной интоксикации; гипокалиемическая форма пароксизмальной миоплегии.

Порошок ацетазоламида

Состав: ацетазоламид, лактоза/глюкоза/кальция глюконат.

Показания: отечный синдром (слабой или умеренной выраженности, в сочетании с алкалозом); купирование острого приступа глаукомы, предоперационная подготовка пациентов, упорные случаи течения глаукомы (в комплексной терапии); при эпилепсии в качестве дополнительной терапии к противоэпилептическим средствам; острая «высотная» болезнь (препарат сокращает время акклиматизации); ликвородинамические нарушения, внутричерепная гипертензия (доброкачественная внутричерепная гипертензия, внутричерепная гипертензия после шунтирования желудочков) в комплексной терапии.

Порошок фуросемида

Состав: фуросемид, лактоза/глюкоза/кальция глюконат.

Показания: отечный синдром при хронической сердечной недостаточности (при необходимости диуретической терапии); отечный синдром при хронической почечной недостаточности; острая почечная недостаточность, включая таковую при беременности и ожогах (для поддержания выведения жидкости); отечный синдром при нефротическом синдроме (при необходимости диуретической терапии); отечный синдром при заболеваниях печени (при необходимости в дополнение к лечению антагонистами альдостерона); артериальная гипертензия.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ





Болтушка при зудящих дерматитах



Мазь противозудная



Бальзам-карандаш после укусов насекомых



Средство при ветряной оспе



Мазь противоожоговая



Мазь регенерирующая



Мазь при опрелостях



Мазь при псориазе



Мазь некролитическая



Спрей с декспантенолом 5%



Средство от повышенного потоотделения



Средство для удаления ороговевшей кожи



Ксероформ



Борная кислота



Лосьон для лица



Лосьон при акне



Жидкость для рук



Никотиновая кислота спрей 1%



Мазь стрептоцидовая



Раствор кислоты салициловой 0,5%



Мазь папаверииновая 1—2%



Раствор Люголя 0,25—5%



Раствор димедрола 0,5%



Раствор никотиновой кислоты 0,1—1%



Клеол



Глицерин стерильный



Раствор по Демьяновичу №1 и №2



Раствор калия перманганата 0,05—10%



Раствор метилено-вого синего 1%



Мазь салициловая 1—40%



Порошок натрия сульфацила



Раствор танин 2%, 4%, 5%



Салицилово-цинковая паста



Растворы: кальция хлорида; димедрола; новокаина



Вазелиновое масло



АСД III, паста Лассара, масло подсолнечное



Мазь димедроловая 0,5—5%



Порошок калия перманганата



Раствор кальция хлорида 0,25—50%

Болтушка при зудящих дерматитах 101,25 мл

Суспензия улучшает регенерацию кожи, снимает зуд и покраснение, обладает противовоспалительными, антимикробными, противогрибковыми и антипролиферативными свойствами.

Состав: димедрол 0,25; анестезин 1,0; цинка окись 10,0; глицерин 20,0; крахмал 10,0; тальк 10,0; вода очищенная 50,0.

Показания: опрелости, дерматиты, пролежни, раны на поверхности кожи, царапины, порезы, ожоги солнечные и температурные, язвенные поражения кожного покрова, трофические язвы, экзема в период обострения, герпетические высыпания, стрептодермия.

Способ применения: наносить на воспаленную кожу 2 раза в сутки, а в более тяжелых случаях — до 4 раз. В случае воспаления на волосяном участке необходимо наносить на кожу, а не на волосы. Перед применением взбалтывать.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года.

Побочные действия: аллергические реакции на компоненты препарата.

Мазь противозудная 30 г

Негормональная мазь, обладающая противовоспалительным и противозудным действием.

Состав: вазелин 13,5; ланолин 10,12; ментол 3,75; кислота борная 1,5; анестезин 0,75; димедрол 0,19.

Показания: зуд после укуса насекомых, крапивница, экзема, зудящий дерматоз.

Способ применения: взрослым и детям старше 3 лет следует наносить на пораженные участки кожи 2–4 раза в сутки.

Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам, беременность, кормление грудью, детский возраст менее 3 лет.

Бальзам-карандаш после укусов насекомых 5,6 г

Оказывает местнораздражающее, отвлекающее, слабое местное противовоспалительное действие. Охлаждает и успокаивает кожу, уменьшает выраженность болевого синдрома и зуда после укуса.

Состав: левоментол 0,62 г; камфора 0,52 г; экстракт календулы масляный 0,2 г; эфирное масло лаванды 0,2 г; парафин 2,0 г; вазелин 0,55 г; ланолин безводный 0,55 г; воск пчелиный 0,96 г.

Показания: при укусах насекомых для предотвращения расчесывания и уменьшения покраснения.

Способ применения: при укусах насекомых смазывать препаратом место укуса по мере необходимости.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 2 лет.

Побочные действия: возможны слезотечение, покраснение и раздражение кожи в области нанесения.

Средство при ветряной оспе 50 мл

Обладает антисептическим, противоаллергическим, местноанестезирующим действием. Быстро устраняет зуд, красноту, дезинфицирует кожу.

Состав: раствор борной кислоты спиртовой 3% до 50 мл; димедрол 0,5; анестезин 1,0.

Показания: укусы насекомых, кожный зуд различного происхождения, симптоматическое лечение ветряной оспы.

Способ применения: наносить раствор при помощи ватного тампона на пораженные участки кожи 1–2 раза в сутки, в более тяжелых случаях — до 4 раз. Применять до полного исчезновения симптомов.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 1 месяца, беременность и период грудного вскармливания, открытые раны, ссадины.

Побочное действие: аллергические реакции на компоненты препарата.

Мазь противоожоговая 70 г

Мазь обладает обезболивающим, антибактериальным, антисептическим, регенерирующим и ранозаживляющим действием.

Состав: вазелин 64,7; метилурацил 3,75; анестезин 0,75; масло вазелиновое 0,45; левомицетин 0,2; фурацилин 0,15.

Показания: гнойные раны, пролежни, ожоги, язвы, остеомиелит, мелкие повреждения кожи и слизистых оболочек (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы).

Способ применения: взрослым и детям старше 3 лет наносить на предварительно очищенную поверхность пораженных участков кожи или на повязку. Длительность лечения зависит от тяжести и течения заболевания.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 3 лет, беременность и период грудного вскармливания.

Побочное действие: дерматиты, аллергические реакции.

Мазь регенерирующая 40 г

Мазь обладает регенерирующим, противомикробным, противовоспалительным действием.

Состав: вазелин 15,73; ланолин 12,0; масло облепиховое 8,0; глицерин 2,4; метилурацил 1,6; левомицетин 0,27.

Показания: ссадины, открытые раны, гнойные раны, порезы, ожоги, экземы, трофические язвы, некротические процессы, обморожения, фурункулы, пролежни.

Способ применения: нанести мазь на пораженные участки кожи, наложить стерильную повязку, зафиксировать. Менять повязку 2 раза в день.

Противопоказания: беременность, кормление грудью, детский возраст до 3 лет, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Мазь при опрелостях 50 г

Мазь выступает в роли антисептического и противовоспалительного средства.

Состав: вода очищенная 10 мл; ланолин 39,5; димедрол 0,2; стрептоцид 0,2; фурацилин 0,1.

Показания: дерматиты, опрелости.

Способ применения: взрослым и детям старше 3 месяцев наносить на проблемные участки 1–2 раза в день до устранения симптомов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, возраст до 3 месяцев.

Мазь при псориазе 50 г

Мазь оказывает кератолитическое действие, снимает зуд, купирует воспаление, усиливает процессы регенерации.

Состав: солидол 25,0; ланолин 7,0; вазелин 10,0; масло облепиховое 1,5; сера 1,5; нефть нафталановая 0,5; экстракт солодки 0,5; экстракт череды 0,5; экстракт эвкалипта 0,5; деготь березовый 0,125.

Показания: псориаз, экземы.

Способ применения: взрослым и детям старше 14 лет наносить на проблемные участки 2 раза в день в течение месяца.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, возраст до 14 лет.

Мазь некролитическая 103,37 г

Состав: вазелин 66,7; ланолин 20,0; вода очищенная 8,3 мл; пепсин 6,67; раствор хлористоводородной кислоты 8,3% 1:10–1,7 мл.

Показания: трофические язвы, пролежни, инфицированные гнойные раны, вялозаживающие раны.

Способ применения: нанести средство на пораженные участки кожи, наложить стерильную повязку, закрепить, оставить на ране не более 24 ч. При необходимости применять повторно.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов. Возраст до 12 лет.

Спрей с декспантенолом 5% 50 мл

Состав: декспантенол 2,5; натрия бензоат 0,1; глицерин 5,0; вода очищенная до 50 мл.

Показания: солнечные и термические ожоги; активизация процесса заживления кожи при мелких повреждениях и трещинах; дерматиты, пролежни, опрелости; лечение и профилактика трещин и воспаления сосков молочных желез во время лактации; профилактика и лечение опрелостей и пеленочного дерматита у грудных детей.

Способ к применению: Наружно путем распыления с расстояния 10–20 см так, чтобы поврежденная поверхность была покрыта препаратом. При солнечных ожогах и дерматологических заболеваниях препарат применяют 3–4 раза в сутки, при лечении ожогов — 1–2 раза в сутки, при лечении ран и трофических язв — 1 раз в сутки. На соски кормящих матерей спрей наносят после каждого кормления. Грудным детям спрей наносят при каждой смене памперса (пеленки).

Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату.

Средство от повышенного потоотделения 50 мл

Раствор обладает антибактериальным эффектом.

Состав: вода очищенная до 50 мл; раствор борной кислоты 3% 17,5 мл; уротропин 2,0; глицерин 1,7; эфирное масло чайного дерева 1,25.

Показания: повышенное потоотделение.

Способ применения: на ватный диск нанести средство, обработать проблемные участки (подмышечные впадины, ладони, ступни). Применять не более 1–2 раз в неделю.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, открытые раны, ссадины, беременность, кормление грудью, детский возраст до 12 лет. Запрещено наносить средство после эпиляции и бритья в течение 48 ч.

Средство для удаления ороговевшей кожи 25 г

Средство обладает выраженным кератолитическим действием.

Состав: коллодий 19,0; кислота салициловая 3,0; кислота молочная 3,0.

Показания: мозоли, бородавки, ороговение кожи, остроконечные кондиломы, гиперкератоз при псориазе (в т.ч. ладонно-подошвенном).

Способ применения: наружно, по 1 или несколько капель 1–2 раза в день (достаточное количество для покрытия) наносить на проблемные участки. Максимальный курс лечения — 7 дней.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, детский возраст до 18 лет.

Ксероформ 5 г

Ксероформ используется в качестве вяжущего, обеззараживающего и подсушивающего средства при различного рода воспалительных поражениях кожных покровов и слизистых оболочек.

Состав: ксероформ 5,0.

Показания: кожные дерматиты различной природы происхождения (в том числе при пеленочном дерматите у детей), язвенные и эрозивные поражения кожных покровов и слизистых, экзематозные поражения, кожные абсцессы, фурункулы, воспалительное поражение лимфатических узлов (лимфаденит), протекающее в острой или хронической форме воспаление лимфатических стволов и капилляров, ожоги, обморожения, пролежни, незначительные повреждения кожного покрова (царапины и ссадины), инфицированные поражения кожи, опрелости (как у детей, так и у взрослых), послеоперационные (в том числе гнойные и мокнущие) раны, пупочные ранки у новорожденных детей.

Способ применения: наносить на кожные покровы 3–4 раза в день.Предварительно кожные покровы необходимо тщательно очистить.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, кормление грудью.

Побочные действия: аллергические реакции на компоненты препарата.

Борная кислота 25 г

Состав: борная кислота 25,0.

Показания: дерматит, пиодермия, мокнущая экзема, опрелости, педикулез, различные заболевания кожи, отиты в разных формах.

Способ применения: длительность курса лечения не более 3–5 дней. Водный раствор готовят из порошка непосредственно перед использованием.

Противопоказания: повышенная чувствительность к препарату, нарушение функции почек, детский возраст до 1 года.

Лосьон для лица 97,7 г

Лосьон снимает воспалительные процессы, очищает поры, удаляет сальные пробки, способствует очищению кожи и восстановлению ее защитных функций.

Состав: левомицетин 1,0; кислота салициловая 1,0; сера осажденная 1,0; борной кислоты спиртовой 3% раствор 50 мл; вода очищенная 50 мл.

Способ применения: средство необходимо применять 1 раз в сутки — вечером, перед сном, на очищенную кожу. Продолжительность курса: не более 2 месяцев.

Противопоказания: беременность, кормление грудью, детский возраст до 14 лет, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия: аллергические реакции на компоненты препарата. Возможно появление шелушащихся участков, морщин, уплотнение верхнего слоя эпидермиса.

Лосьон при акне 103,25 г

Лосьон оказывает противовоспалительное, противомикробное действие, снижает секрецию сальных желез, устраняет жирный блеск, также решает проблему появившихся угрей и воздействует на причины их возникновения.

Состав: салициловая кислота 1,5; резорцин 2,0; сера осажденная 5,0; раствор борной кислоты 3% 50 мл; вода очищенная 50 мл.

Показания: симптоматическое лечение розаций.

Способ применения: протирать очаги поражения ватным тампоном один раз в день, вечером перед сном, на очищенную кожу. Использовать не более 2 месяцев.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата; индивидуальная непереносимость; беременность; лактация; детский возраст до 14 лет.

Побочное действие: возможны аллергические реакции. Входящие в состав смеси спирты и кислоты при частом нанесении могут негативно отразиться на состоянии здоровой кожи. Возможно появление шелушащихся участков, морщин, уплотнение верхнего слоя эпидермиса.

Жидкость для рук 99 мл

Раствор оказывает антисептическое, противовоспалительное действие, а также улучшает эластичность кожи.

Состав: глицерин 33 мл, аммиак 10% 33 мл, вода очищенная до 99 мл.

Показания: для наружного применения при сухой коже рук и ее трещинах, царапинах, мелких ранах.

Способ применения: средство наносить на чистую и сухую кожу рук 2–3 раза в день.

Противопоказания: открытые раны, дерматиты, экзема и другие кожные заболевания, повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания.

Побочные действия: аллергические реакции (покраснение и высыпания на коже, зуд).

Никотиновая кислота спрей 1% 50 мл

Раствор никотиновой кислоты для укрепления и роста волос.

Состав: никотиновая кислота 0,5; вода очищенная до 50 м.

Показания: активизирует обменные процессы, приостанавливает облысение, поддерживает нормальную пигментацию волос.

Способ применения: с помощью распылителя равномерно нанести до 5 мл раствора (до 35 нажатий) на кожу головы у корней волос. Не смывать. Применять 1 раз в 3 дня. Рекомендуемый курс — 14 процедур. Курс можно повторять раз в 3 месяца. Легкое покалывание и покраснение кожи головы после нанесение средства обусловлено усилением микроциркуляции и является нормой.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Меры предосторожности: перед применением небольшое количество средства нанесите на локтевой сгиб для выявления индивидуальной непереносимости. При появлении симптомов, характеризующихся сильным жжением и покраснением кожи головы, смойте нанесенное средство. Дальнейшее применение средства следует прекратить. Избегать попадания в глаза. При попадании тщательно промыть большим количеством теплой воды. Только для наружного применения.

Мазь стрептоцидовая 30%

Состав: стрептоцид, вазелин.

Показания: инфицированные раны различной этиологии, ожоги (I–II ст.), фолликулиты, фурункул, карбункул, вульгарные угри, импетиго, др. гнойно-воспалительные процессы кожи.

Раствор кислоты салициловой 0,5%

Состав: салициловая кислота, вода очищенная.

Показания: обыкновенные угри, жирная себорея, хроническая экзема.

Мазь папаверинoвая 1—2%

Состав: папаверина гидрохлорид, вазелин.

Показания: для снятия зуда и раздражения, псориаз, экзема, дерматит.

Раствор Люголя 0,25—5%

Состав: йод кристаллический, калия йодид, вода очищенная.

Показания: для местного применения: хронический тонзиллит, атрофический ринит, гнойный отит, трофические и варикозные язвы, раны, инфицированные ожоги, свежие термические и химические ожоги I-II степени.

Для наружного применения: инфекционно-воспалительные поражения кожи и слизистой, травмы, раны, миалгии. Оказывает противовоспалительное и противогрибковое действие.

Раствор димедрола 0,5%; 1%; 5%; 10%

Состав: димедрол, вода очищенная.

Показания: анафилактические и анафилактоидные реакции (в комплексной терапии), отек Квинке, сывороточная болезнь, другие острые аллергические состояния (в комплексной терапии и в тех случаях, когда использование таблетированной формы невозможно).

Раствор никотиновой кислоты 0,1—1%

Состав: кислота никотиновая, вода очищенная.

Показания: заживление ран на слизистых оболочках и коже, улучшение углеводного обмена, расширение сосудов.

Клеол

Состав: клеол.

Показания: для обработки микротравм — ссадин, царапин, порезов. Для фиксации повязок.

Глицерин стерильный

Показания: увлажнение кожи и слизистых оболочек.

Раствор по Демьяновичу №1 и №2

Состав: №1—60% раствор натрия тиосульфата, №2—6% раствор хлористоводородной кислоты.

Показания: паразитарные заболевания кожи: чесотка, демодекоз, грибковые заболевания кожи и псевдомикозы: разноцветный (отрубевидный) лишай, себорея волосистой части головы, себорейная экзема, эритразма.

Раствор калия перманганата 0,05—10%

Состав: калия перманганат, вода очищенная.

Показания: для лечения ожогов, ран, язв, обработка послеоперационных ран.

Раствор метиленового синего 1%

Состав: метиленовый синий, вода очищенная.

Показания: стоматит, пиодермия, ожоги, фолликулиты и другие кожные заболевания.

Мазь салициловая 1–40%

Состав: кислота салициловая, вазелин.

Показания: жирная себорея, обыкновенные угри, хроническая экзема, псориаз, дискератозы, ихтиоз, бородавки, мозоли, ожоги, грубая кожа.

Порошок натрия сульфацила 0,5 г

Состав: сульфацил натрия.

Показания: стрептодермия и стафилодермия, инфекционные раны и инфекции, вызванные кишечной палочкой. Внутрь сульфацил натрия назначается при колибациллярных инфекциях мочевых путей, мастоидитах, пуэрперальном сепсисе и других инфекционных заболеваниях.

Раствор танина 2%, 4%, 5%

Состав: танин, вода очищенная.

Показания: ожоги, язвы, трещины и пролежни.

Салицилово-цинковая паста

Состав: салициловая кислота, цинка оксид, крахмал, вазелин.

Показания: подострая экзема различного генеза, гипергидроз стоп.

Раствор кальция хлорида, раствор димедрола, раствор новокаина

Состав: раствор кальция хлорида, раствор димедрола, раствор новокаина.

Показания: кожные заболевания, экземы, псориаз.

Вазелиновое масло стерильное

Состав: вазелиновое масло.

Показания: увлажнение кожи у новорожденных.

АСД III, паста Лассара, масло подсолнечное

Состав: АСД III, паста Лассара, масло подсолнечное.

Показания: дерматиты, экземы.

Мазь димедроловая 0,5—5%

Состав: димедрол, ланолин, вазелин.

Показания: аллергический дерматит, укусы насекомых, дерматит, крапивница, экзема, зудящие раны и ссадины, термические и солнечные ожоги I степени, фотодерматоз (солнечная аллергия).

Порошок калия перманганата

Состав: калия перманганат.

Показания: для приготовления раствора для местного и наружного применения.

Раствор кальция хлорида 0,25—50%

Состав: кальция хлорид, вода очищенная.

Показания: зуд, экзема, псориаз, как дополнительное средство при лечении аллергических заболеваний (в т.ч. сывороточная болезнь, крапивница, ангионевротический отек, сенная лихорадка) и аллергических реакций на лекарства.

АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИ-РУЮЩИЕ СРЕДСТВА





Жидкость для рук с антисептическим эффектом 50 мл



Мазь борная 1%, 3%, 5%



Йодоформ



Раствор Люголя на глицерине 1—3%



Мазь ихтиоловая



Мазь фурацилиновая 0,2—0,5%



Раствор перекиси водорода 3%, 6%



Раствор резорцина 1%, 2%



Стрептоцид



Порошок резорцина



Цинка оксид



Мазь ксероформная



Мазь дерматоловая



Раствор хлоргексидина 0,01—10%



Раствор хлоргексидина 0,05—0,5%

Жидкость для рук с антисептическим эффектом 50 мл

Состав: вода, глицерин, хлоргексидин б/г 20%.

Показания: обработка рук с целью дезинфекции.

Способ применения: небольшое количество жидкости нанести на кожу рук и втирать до полного высыхания.

Противопоказания: открытые раны, дерматиты, экзема и другие кожные заболевания, беременность. лактация.

Мазь борная 1%, 3%, 5%

Состав: борная кислота, вазелин.

Показания: мокнущая экзема, дерматит, пиодермия, опрелости, острый и хронический отит, кольпит, педикулез.

Йодоформ

Состав: йодоформ.

Показания: наружно для лечения язв и инфицированных ран различного генеза.

Раствор Люголя на глицерине 1—3%

Состав: йод, калия йодид, глицерин.

Показания: инфекционно-воспалительные заболевания слизистой оболочки рта и глотки.

Мазь ихтиоловая

Состав: ихтиол, вазелин.

Показания: ожоги, рожистое воспаление, экзема и другие заболевания кожи, невралгии, артриты; простатит, метрит, параметрит, сальпингит и другие воспалительные заболевания органов малого таза.

Мазь фурацилиновая 0,2%

Состав: фурацилин, масло вазелиновое, вазелин.

Показания: гнойные раны, пролежни, язвы, ожоги II и III степени, остеомиелит, эмпиема плевры, анаэробная инфекция раневой поверхности, фурункул наружного слухового прохода, эмпиема придаточных пазух носа.

Раствор перекиси водорода 3%, 6%

Состав: перекись водорода 35%, вода очищенная.

Показания: раствор перекиси водорода 3% — Воспалительные заболевания слизистых оболочек, гнойные раны, капиллярное кровотечение из поверхностных ран, носовые кровотечения; раствор перекиси водорода 6% — для: дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, медицинских приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды, игрушек, предметов ухода за больными, уборочного материала, изделий медицинского назначения (включая коррозионностойкие хирургические и стоматологические инструменты, стоматологические отгибки силиконовые) при инфекциях бактериальной (включая туберкулез и особо опасные инфекции — сибирскую язву, чуму, сап, мелиоидоз, холеру, туляремию), вирусной этиологии и дерматофитиях.

Раствор резорцина 1%, 2%

Состав: вода очищенная, резорцин.

Показания: обеззараживающее средство при лечении кожных заболеваний (нейродермит, экзема; себорейный дерматит; грибковые заболевания; кожный зуд, сикоз, угри; заболевания аноректальной области; алопеция — как раздражающее средство).

Стрептоцид

Состав: стрептоцид.

Показания: гнойные раны, инфицированные ожоги (I–II степени) и другие гнойно-воспалительные процессы мягких тканей.

Порошок резорцина

Состав: резорцин.

Показания: обеззараживающее средство при лечении кожных заболеваний (нейродермит, экзема; себорейный дерматит; грибковые заболевания; кожный зуд, сикоз, угри; заболевания аноректальной области; алопеция — как раздражающее средство).

Цинка оксид

Состав: цинка оксид.

Показания: дерматит, в т.ч пеленочный дерматит (лечение и профилактика); опрелость; потница; поверхностные раны и ожоги (в т.ч. солнечные ожоги, порезы, царапины); язвенные поражения кожи (в т.ч. трофические язвы), пролежни; экзема в стадии обострения; простой герпес; стрептодермия.

Мазь ксероформная

Состав: ксероформ, вазелин.

Показания: дерматиты, экземы, раны и ожоги.

Мазь дерматоловая

Состав: дерматол, вазелин.

Показания: воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, сопровождающиеся экссудацией (язвы, дерматиты, экзема), геморрой, остроконечные кондиломы.

Раствор хлоргексидина стерильный 0,01%—10%

Состав: хлоргексидин б/г 20%, вода очищенная.

Показания: гнойные раны, инфицированные ожоги, бактериальные и грибковые заболевания кожи и слизистых оболочек, в т.ч. в стоматологии (полоскания и орошения — гингивит, стоматит, афты, пародонтит, альвеолит), хирургии, урологии, акушерстве-гинекологии. 0,2% раствор: для обработки и санации половых путей в гинекологии при проведении лечебно-диагностических процедур, для дезинфекции съемных протезов. 0,5% раствор: для обработки ран и ожоговых поверхностей; для обработки инфицированных поверхностей и трещин кожи и открытых слизистых оболочек. Для дезинфекции рабочих поверхностей приборов.

Раствор хлоргексидина спиртовой 0,05%, 0,5%,

Состав: хлоргексидин б/г 20%, спирт этиловый 70%.

Показания: гнойные раны, инфицированные ожоги, бактериальные и грибковые заболевания кожи и слизистых оболочек, в т.ч. в стоматологии (полоскания и орошения — гингивит, стоматит, афты, пародонтит, альвеолит), хирургии, урологии, акушерстве-гинекологии. 0,2% раствор: для обработки и санации половых путей в гинекологии при проведении лечебно-диагностических процедур, для дезинфекции съемных протезов. 0,5% раствор: для обработки ран и ожоговых поверхностей; для обработки инфицированных поверхностей и трещин кожи и открытых слизистых оболочек. Для дезинфекции рабочих поверхностей приборов.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ





Силденафил свечи



Раствор колларгола 0,2–5%

Силденафил свечи

Состав: силденафил, какао-масло.

Показания: местное действие для наращивания эндометрия.

Фасовка: по назначению врача.

Раствор колларгола 0,2–5%

Состав: колларгол, вода очищенная.

Показания: как антисептический препарат для лечения воспаления лимфатических узлов, а также воспалений в мочевом пузыре. Оказывает противовоспалительное и бактерицидное действие.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА





Растирка
с камфорой 50 мл



Спрей с диклофена-
ком и димексидом
50 мл



Мазь
обезболивающая 70 г



Мазь обезболива-
ющая без согревающего
эффекта 70 г



Раствор кальция
хлорида 1%, 2%, 5%



Парафин



Озокерит

Растирка с камфорой 50 мл

Состав: левоментол 1,25 г; камфора 1,25 г; прокаин (новокаин) 1,0 г; анестезин 1,0 г; раствор борной кислоты спиртовой 3% 45,68 мл.

Показания: применяют в качестве местного обезболивающего средства; как противозудное средство при зудящих дерматозах; для профилактики образования пролежней.

Способ применения: наносят на кожу над пораженной областью и растирают 2–3 раза в день. Курс лечения 7–10 дней. При зудящих дерматозах наносят на пораженные участки кожи 2–3 раза в день.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, мокнущие дерматозы, экзема, инфицированные ссадины и раны, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Спрей с диклофенаком и димексидом 50 мл

Состав: диклофенак натрия 2,5 г; прокаина гидрохлорид (новокаин) 1,0 г; диметилсульфоксид (димексид) 12,5 г; раствор борной кислоты спиртовой 3% 19,32 мл; вода очищенная до 50 мл.

Показания: остеоартроз; боль и отечность мягких тканей; боли в мышцах вследствие ревматических заболеваний и травм; ушибы, растяжение связок.

Способ применения: нанести раствор на марлевую салфетку, наложить ее на пораженный участок и зафиксировать полученный компресс пластырем или бинтом на 30 минут. Компресс накладывать 2–3 раза в день. Рекомендуемый курс лечения — 10 дней.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; нарушение целостности кожных покровов или воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения (в т.ч. дерматит, экзема); беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет.

Побочные действия: в процессе применения препарата могут возникнуть аллергические реакции, эритематозные высыпания, контактный дерматит, сухость кожи, легкое жжение. Специфический запах препарата может вызывать тошноту, позывы на рвоту, в единичных случаях возможен бронхоспазм.

Мазь обезболивающая 70 г

Мазь обладает выраженными анальгезирующими и противовоспалительными свойствами.

Состав: вода очищенная 1,8 мл; вазелин 39,2; ланолин 14,2; ментол 7,0; ибупрофен 3,5; масляный экстракт стручкового перца 2,5; анальгин 0,9; новокаин 0,9.

Показания: мышечная боль, боль в спине, артриты, боль при повреждениях связок и растяжениях; спортивные травмы; невралгия.

Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет наносить небольшое количество мази на область поражения и тщательно втирать легкими движениями до полного впитывания. Повторное применение препарата возможно только через 4 часа и не более 4 раз в сутки. После применения мази необходимо тщательно вымыть руки.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, мокнущие дерматозы, экзема, инфицированные ссадины и раны, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Мазь обезболивающая без согревающего эффекта 70 г

Мазь обладает выраженными анальгезирующими и противовоспалительными свойствами.

Состав: вода очищенная 1,8 мл; вазелин 44,2; ланолин 16,2; ибупрофен 3,5; вазелиновое масло 2,5; анальгин 0,9; новокаин 0,9.

Показания: артрит (ревматоидный, псориатический, подагрический), плечелопаточный периартрит, анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева), остеоартроз, остеохондроз с корешковым синдромом, радикулит, тендовагинит, бурсит, люмбаго, ишиас, миалгия, травмы без нарушения целостности мягких тканей (вывих, растяжение или разрыв мышц и связок, ушиб, посттравматический отек мягких тканей).

Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет наносить небольшое количество мази на область поражения и тщательно втирать легкими движениями до полного впитывания. Повторное применение препарата возможно только через 4 часа и не более 4 раз в сутки. После применения мази необходимо тщательно вымыть руки. Продолжительность курса не более 10 дней.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, мокнущие дерматозы, экзема, инфицированные ссадины и раны, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет.

Раствор кальция хлорида 1%, 2%, 5%

Состав: кальция хлорид, вода очищенная.

Показания: дисплазия тазобедренных суставов или врожденный вывих у грудничков; последствия черепно-мозговых и иных травм; нарушение циркуляции крови в сосудах головного мозга, обменные патологии; гипертонус мышц у новорожденных, который мешает выполнению двигательной функции; кривошея у грудничка (ребенок поворачивает и наклоняет голову только в одну сторону).

Парафин

Состав: парафин.

Показания: заболевания опорно-двигательной системы, боль в мышцах и суставах.

Озокерит

Состав: озокерит.

Показания: заболевания опорно-двигательного аппарата (суставов, костей, мышц). Травматические поражения опорно-двигательного аппарата (суставов, костей, мышц); последствия травм (при переломах, вывихах, спортивных травмах); заболевания центральной и периферической нервной системы (радикулит, невриты, невралгии); заболевания кожного покрова (чешуйчатый лишай, нейродермит, дерматозы).

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ





Капли успокаивающие 45 мл



Капли успокаивающие без димедрола 45 мл



Сухая микстура Павлова 1,5 г



Раствор магния сульфата 0,5—25%



Микстура Кватера



Раствор новокаина 0,1—6%



Раствор эуфиллина 0,1—5%



Натрия бромид, магния сульфат, настойка валерианы, настойка пустырника



Раствор натрия бромида 1—5%



Раствор кофеин-бензоат натрия 1%, 5%



Аминофенилмасляная кислота

Капли успокаивающие 45 мл

Обладают успокоительным, гипотензивным, спазмолитическим действием на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Состав: настойка валерианы 10,0 мл; настойка боярышника 10,0 мл; настойка пустырника 10,0 мл; корвалол 15,0; димедрол г/х 0,03.

Показания: стрессовые состояния, нервная возбудимость, тревожность, начальная стадия гипертонии, вегетососудистая дистония, учащенное сердцебиение, неврозы, нарушение сна, укрепление сердечной мышцы.

Способ применения:

- повышенное давление, стрессовые состояния — 30–35 капель;
- нервозность, тревожность — 15–20 капель 3–4 раза в сутки;
- бессонница — 40 капель за 20 минут до сна.

Капли необходимо растворять в ¼ стакана воды.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь в период обострения, низкое артериальное давление, тяжелые нарушения функции почек и/или печени, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

Побочные действия: снижение частоты сердечного ритма, гипотония, головокружение, заторможенность, сонливость, тошнота, рвота, аллергические реакции.

Капли успокаивающие без димедрола 45 мл

Состав: настойка валерианы 10,0 мл; настойка боярышника 10,0 мл; настойка пустырника 10,0 мл; корвалол 15,0 мл.

Показания: нарушения сна, неврозоподобные состояния, сопровождающиеся повышенной раздражительностью и возбудимостью, состояния возбуждения с выраженными вегетативными проявлениями (вегетососудистая дистония). В качестве симптоматического (сосудорасширяющего и кардиотонического) средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы. В качестве спазмолитического средства – при спазмах желудочно-кишечного тракта.

Способ применения:

- повышенное давление, стрессовые состояния — 30–35 капель;
- нервозность, тревожность — 15–20 капель 3–4 раза в сутки;
- бессонница — 40 капель за 20 минут до сна.

Капли необходимо растворять в ¼ стакана воды.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенные болезни в период обострения, низкое артериальное давление, тяжелые нарушения функции почек и/или печени, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

Побочные действия: снижение частоты сердечного ритма, гипотония, головокружение, заторможенность, сонливость, тошнота, рвота, аллергические реакции.

Сухая микстура Павлова 1,5 г

Состав: натрия бромид 1,0 г; кофеин-бензоат натрия 0,5 г.

Показания: нарушения сна, вегетативная дисфункция, неврастения, неврозы, тревожные состояния.

Способ применения: перед применением добавить во флакон 200 мл охлажденной кипяченой воды для разведения микстуры. Принимать взрослым по 1 столовой ложке (15 мл) 3 раза в день. Перед применением взбалтывать. Курс лечения составляет 3–4 месяца с перерывом в 1 неделю после каждых 3 недель приема. При бессоннице принимать по 1 столовой ложке (15 мл) за 20–30 минут до сна.

Противопоказания: повышенная чувствительность к препаратам брома; возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания.

Раствор магния сульфата 0,5—25%

Состав: магния сульфат, вода очищенная.

Показания: нарушения в работе костно-мышечного аппарата, воспалительные процессы и инфекции органов, гипотонус мышц у новорожденного, заболевания неврологического характера, устранение последствий родовой травмы.

Микстура Кватера

Состав: магния сульфат, натрия бромид, корень валерианы, лист мяты, кофеин-натрия бензоат, вода очищенная.

Показания: при психологическом напряжении, судорожных состояниях, депрессии, нарушениях сна, повышенной нервозности, стрессах, постоянном физическом и умственном переутомлении, панических расстройствах, фобиях, состоянии постоянной тревожности.

Раствор новокаина 0,1—6%

Состав: новокаин, вода очищенная.

Показания: выраженное снижение интенсивности любой воспалительной реакции, противоотечное действие, уменьшение или полная ликвидация болевых ощущений, снижение патологически повышенного тонуса скелетной мускулатуры, нормализация циркуляции крови в пораженной области, стимуляция синтеза биологически активных веществ.

Раствор эуфиллина 0,1—5%

Состав: эуфиллин, вода очищенная.

Показания: боли в спине вследствие остеохондроза, межпозвоночные грыжи, патологическая чувствительность кожи к внешним раздражителям или полное ее отсутствие, детский церебральный паралич, низкая температура конечностей при нормальных или близких к ним климатических условиях, отеки тканей у маленьких детей, патологическая подвижность в шейном отделе позвоночника (ШОП), гипертонус и гипотонус мышц у грудничков (проводится электрофорез с эуфиллином и папаверином для усиления эффекта от терапии), хронические воспалительные заболевания костей и суставов в период ремиссии, дисплазия тазобедренного сустава у детей младшего возраста.

Натрия бромид, магния сульфат, настойка валерианы, настойка пустырника, вода очищенная

Состав: натрия бромид, магния сульфат, настойка валерианы, настойка пустырника, вода очищенная.

Показания: нервное возбуждение, расстройство сна, истерия.

Раствор натрия бромида 1—5%

Состав: натрия бромид, вода очищенная.

Показания: оказывает седативное, противосудорожное действие. Применяется при неврозах, неврастении, бессоннице, повышенной возбудимости ЦНС.

Раствор кофеин-бензоат натрия 1%, 5%

Состав: кофеин-бензоат натрия, вода очищенная

Показания: снижение умственной и физической работоспособности, сонливость, головная боль сосудистого генеза (в т.ч. мигрень), умеренная артериальная гипотензия.

Аминофенилмасляная кислота, порошок для приема внутрь

Состав: аминофенилмасляная кислота, лактоза/глюкоза/кальция глюконат.

Показания: астенические и тревожно-невротические состояния; заикание, тики и энурез у детей; бессонница и ночная тревога у пациентов пожилого возраста; болезнь Меньера, головокружения, связанные с дисфункцией вестибулярного анализатора сосудистого и травматического генеза; профилактика укачивания при кинетозах.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ





Антигриппин



Витамин С



Микстура
от кашля



Сухая микстура
от кашля



Раствор протаргола
0,5%, 1%, 2%, 3%, 5%,
10%



Спрей
от насморка 15 мл



Спрей от насморка
и заложенности носа



Средство гигиеническое
для очищения и увлаж-
нения спрей на основе
соляного р-ра



Капли с эфирными
маслами 14 г



Мазь
«Кориза»



Мазь
«Звездочка»



Мазь
при простуде



Раствор фурацилина
стерильный 1:5000



Средство при
осиплости



Средство от жара
и боли



Димедрол, ментол,
новокаин, вазелин,
раствор адрена-
лина 0,1%, ланолин



Мазь сложная: папаверин,
димедрол, эуфиллин,
ланолин, масло подсол-
нечное, вода очищенная

Антигриппин 0,55 №20

Для симптоматического лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Состав: ацетилсалициловая кислота 0,25; аскорбиновая кислота 0,275; димедрол 0,01; рутин 0,01; фенилэфрин 0,005.

Показания: простудные заболевания (ОРВИ, грипп), сопровождающиеся повышенной температурой, ознобом, головной болью, болями в суставах и мышцах, заложенностью носа и болями в горле и пазухах носа.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата. Эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения); склонность к кровотечениям; закрытоугольная глаукома; бронхиальная астма. Детский возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания.

Побочные действия: аллергические реакции на компоненты препарата; тошнота, боль в эпигастральной области; головная боль, чувство усталости, сухость во рту, задержка мочи, сонливость.

Витамин С 500 мг №10

Витамин С повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям.

Состав: аскорбиновая кислота 0,5; глюкоза 1,5.

Показания: обеспечение повышенной потребности организма в витамине С в период острых респираторных и инфекционных заболеваний. Лечение и профилактика гипо- и авитаминоза С.

Способ применения и дозы: взрослым принимать по 1 пакетику 1 раз в день, предварительно растворив в 100 мл воды комнатной температуры. Продолжительность приема — 10 дней.

Побочное действие: нарушения со стороны пищеварительной системы: раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (тошнота, рвота, диарея, спазм желудочно-кишечного тракта); угнетение инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия).

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции.

При применении в высоких дозах: нарушения со стороны почек и мочевыводящей системы: гипероксалурия и нефрокальциноз (оксалатный).

Изменение лабораторных показателей: тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, эритропения, нейтрофильный лейкоцитоз, гипокалиемия.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, нарушение углеводного обмена, тромбоз, тромбофлебит, сахарный диабет, мочекаменная болезнь. Детский возраст до 18 лет.

Микстура от кашля 200 мл

Препарат применяют в комплексе с другими лекарственными средствами для лечения детей и взрослых с воспалительными заболеваниями дыхательных путей различной этиологии, которые сопровождаются кашлем.

Состав: экстракт алтейного корня сухой 6,0; натрия гидрокарбонат 2,0; натрия бензоат 2,0; капли нашатырно-анисовые 2,0 мл; грудной эликсир 2,0 мл; вода очищенная до 200,0 мл.

Показания: применяют в комплексной терапии в качестве отхаркивающего средства при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся трудноотделяемой мокротой (в том числе трахеит, трахеобронхит, бронхит).

Способ применения:

- детям с 3 месяцев до 3 лет – 1 чайная ложка (5 мл) 3 раза в сутки;
- детям с 3 до 7 лет – 1 десертная ложка (10 мл) 3 раза в сутки;
- детям старше 7 лет и взрослым – 1 столовая ложка (15 мл) 3 раза в сутки.

Принимать внутрь после еды.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, детский возраст до 3 месяцев, беременность, период лактации.

Сухая микстура от кашля 26,7 г

Комбинированный препарат, стимулирующий отхаркивание и способствующий легкому отхождению мокроты из дыхательных путей. Оказывает также противовоспалительное действие.

Состав: экстракт термопсиса сухой 0,75; экстракт солодки сухой 2,5; натрия гидрокарбонат 5,0; натрия бензоат 5,0; глюкоза 13,45.

Показания: кашель с вязкой и трудноотделяемой мокротой при трахеите, бронхопневмонии, бронхите.

Способ применения: перед применением развести во флаконе сухую микстуру охлажденной кипяченой водой до отметки 250. Принимать по 1 столовой ложке (15 мл) 3 раза в день после еды. Перед применением взбалтывать.

Противопоказания: острый пиелонефрит, гломерулонефрит, беременность, лактация, непереносимость фруктозы, повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 14 лет.

Раствор протаргола 0,5%; 1%; 2%; 3%; 5%; 10%

Обладает выраженным антисептическим, противовоспалительным, подсушивающим, противомикробным и противогрибковым действием.

Состав: протаргол, вода очищенная.

Показания: острый и хронический ринит, назофарингит, синусит, гайморит, аденоидит.

Способ применения: 1–3 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки. Носовой ход предварительно должен быть очищен.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет, беременность, период грудного вскармливания, атрофический ринит.

Побочные действия: жжение и зуд в момент применения.

Спрей от насморка 15 мл

Острый ринит, хронический ринит, аллергический ринит.

Состав: вода 15мл, стрептоцид 0,08, димедрол 0,015 фурацилин 0,003, адреналина г/хлорид 0,1% — 5кап.

Показания: для облегчения дыхания через нос при простудных заболеваниях, гриппе, аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся острым ринитом или синуситом.

Способ применения: взрослым и детям старше трех лет применять по 1–2 капли 3 раза в день до устранения симптомов.

Противопоказания: Противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Спрей от насморка и заложенности носа 15 мл

Обладает антибактериальным, антисептическим, противовоспалительным, анестезирующим действием, сужает сосуды слизистой носа и снимает отек.

Состав: фенилэфрина г/х 0,0375; димедрол 0,015; фурацилин 0,003; вода очищенная 15 мл.

Показания: для облегчения дыхания через нос при простудных заболеваниях, гриппе, аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся острым ринитом или синуситом.

Способ применения: взрослым и детям старше 6 лет применять по двум впрыскиваниям в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки (не чаще чем каждые 4 часа). Продолжительность курса не более 7 дней.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, заболевания сердечно-сосудистой системы (в т.ч. коронаросклероз,стенокардия), гипертонический криз, тиреотоксикоз, сахарный диабет, одновременный прием ингибиторов МАО (а также 2 недели после их отмены), беременность, период лактации.

Побочное действие: жжение, пощипывание или покалывание в носу, головная боль, головокружение, ощущение сердцебиения, аритмия, повышение АД, потливость, бледность, тремор, нарушение сна.

Средство гигиеническое для очищения и увлажнения спрей на основе соляного р-ра

Спрей очищает и увлажняет слизистую, способствует разжижению густой слизи и естественному выведению застоявшегося секрета.

Состав: вода, соль морская.

Показания: для облегчения дыхания через нос при простудных заболеваниях, гриппе, аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся острым ринитом или синуситом.

Способ применения: производить орошение слизистых оболочек двумя нажатиями на клапан флакона.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза. При попадании тщательно промыть большим количеством тёплой воды.

Капли с эфирными маслами 14 г

Состав: левоментол 0,42; эфирное масло эвкалипта 0,42; эфирное масло сосны 0,42; эфирное масло чайного дерева 0,42; масло вазелиновое 12,67.

Показания: острые и хронические воспалительные заболевания слизистых оболочек носа и носоглотки, сопровождающиеся высыханием слизистых оболочек носа.

Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет — закапывать в первый день по 1–2 капли в каждый носовой ход с интервалами в 1–2 ч, в последующие дни — по 1–2 капли в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки; детям с 2 до 12 лет — по 1–2 капли 3–4 раза в день.

Возможно применение препарата для ингаляций, для чего 2 мл (50 капель) закапывают в ингалятор. Ингаляции рекомендуется проводить 2–3 раза в день. Длительность лечения — 5–7 дней.

Противопоказания: аллергический ринит; детский возраст до 2 лет; гиперчувствительность.

Побочные действия: в редких случаях возможны аллергические реакции, легкое жжение, зуд, отечность слизистой оболочки носовой полости.

Мазь «Кориза» 10 г

Мазь оказывает противовоспалительное, сосудосуживающее, анальгезирующее, секретолитическое действие при нанесении на поверхность слизистой оболочки носа.

Состав: фенилэфрина гидрохлорид 0,025; ментол 0,095; фенол 0,024; масло эвкалипта 0,095; вазелин 9,026; ланолин 0,32; натрия хлорид 0,095; вода очищенная 0,032.

Показания: применяется при заложенности носа, насморке, а также для профилактики ОРЗ и гриппа.

Способ применения: взрослым и детям старше 3 лет мазь закладывать в пазухи носа до 3 раз в день. Возможно лечение препаратом в составе комбинированной терапии в сочетании с другими лекарственными средствами.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет, беременность и период грудного вскармливания.

Побочные действия: аллергические реакции на компоненты препарата.

«Звездочка» мазь стик 5,6 г

Состав: масло эфирное корицы 0,06; масло эфирное гвоздики 0,17; масло эфирное эвкалипта 0,19; вазелин 0,31 г; ланолин безводный 0,34; левоментол 0,62; воск пчелиный 0,62; масло эфирное мяты перечной 0,78; камфора 1,23; парафин 1,29.

Показания: применяется в качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний (ОРЗ), гриппа; при головной боли, головокружении; при рините (насморке); при укусах насекомых.

Способ применения: при головной боли и головокружениях мазь втирают в кожу височной и затылочной областей; при насморке, ОРЗ мазь втирают в кожу крыльев носа, височной области; при укусах насекомых смазывают препаратом место укуса. Курс лечения не должен превышать 5 дней.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого применения препарата (пиодермия, дерматит, экзема); склонность к судорогам; бронхиальная астма, коклюш; детский возраст до 2 лет. В связи с отсутствием специальных исследований, применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Побочные действия: слезотечение, покраснение и раздражение кожи в области нанесения препарата. В редких случаях — аллергические реакции.

Мазь при простуде 10 г

Оказывает местнораздражающее, отвлекающее, противовоспалительное и антисептическое действие.

Состав: эфирное масло эвкалипта 1,5; эфирное масло гвоздики 0,5; камфора 1,0; парафин 3,55; вазелин 3,55.

Показания: симптоматическая терапия острых респираторных заболеваний, сопровождающихся насморком, чувством заложенности носа, кашлем и болью в горле, а также при головных болях и болях в мышцах.

Способ применения: только для наружного применения. При насморке или заложенности носа нанесите мазь на кожу крыльев носа; при головной боли нанесите мазь на кожу височной области,в кожу шеи при кашле и боли в горле; в кожу спины при кашле. Продолжительность лечения в среднем до 5 дней. При болях в мышцах, спине нанесите мазь на болезненную область.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, индивидуальная непереносимость, детский возраст до 3 лет, повреждения кожных покровов, наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого применения препарата, бронхиальная астма, эпилепсия.

Побочное действие: возможны аллергические реакции, слезотечение, покраснение и раздражение кожи в области нанесения, очень редко — аллергический дерматит.

Особые указания: следует избегать контакта со слизистой оболочкой глаз и полости рта, а также с поврежденными участками кожи. В случае попадания мази на участки лица, не перечисленные в инструкции, следует удалить препарат при помощи салфетки и промыть обильным количеством воды.

Раствор фурацилина стерильный 1:5000 390 мл

Раствор обладает выраженным антибактериальным эффектом, угнетающим активность грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Состав: фурацилин 0,078; натрия хлорид 3,51; вода очищенная до 390 мл.

Показания: гнойные раны, пролежни, ожоги II и III степени, мелкие повреждения кожи (в т.ч. ссадины, царапины, трещины, порезы), острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

Особые указания: при применении препарата у пациентов с нарушением функции почек на тяжелые ожоги большой площади возможно прогрессирование почечной недостаточности (уремия, нарушение водно-электролитного баланса, метаболический ацидоз). Если после лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения: раствор применяют для орошения ран, пролежней, мелких повреждений кожи и наложения влажных повязок. Повязки следует менять от 2 до 6 раз в сутки в зависимости от степени повреждения. При остром тонзиллите (ангине), стоматите, гингивите — полоскание рта и горла теплым раствором 3–4 раза в день.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов; дерматозы аллергического характера; кровотечение; выраженные нарушения функции почек.

Побочные действия: аллергические реакции на компоненты препарата.

Средство при осиплости 0,46 г №10

Порошок оказывает местнораздражающее, отвлекающее, противовоспалительное и общеукрепляющее действие.

Состав: декстроза 0,3; аскорбиновая кислота 0,15; ментол 0,01.

Показания: осиплость голоса; ларингит.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, индивидуальная непереносимость; возраст до 18 лет; беременность и кормление грудью; осложнения варикоза; гипергликемия; сахарный диабет; гиперлактацидемия; гипергидратация; артериальная гипотензия.

Способ применения: взрослым по 1 порошку рассасывать 3–4 раза в день после еды.

Побочное действие: возможны аллергические реакции.

Особые указания: при несоблюдении рекомендаций наступает передозировка, которую можно определить по следующим симптомам: колики, тошнота, рвота, головокружение.

Средство от жара и боли 50 мг №5

Ибупрофен оказывает жаропонижающее, анальгезирующее, противовоспалительное действие.

Состав: ибупрофен 0,05; глюкоза 0,5.

Показания: препарат применяют для лечения детей с 3 месяцев до 3 лет. Предназначен для симптоматического лечения в качестве жаропонижающего средства при ОРЗ (в том числе гриппе), детских инфекциях, других инфекционно-воспалительных заболеваниях и постпрививочных реакциях, сопровождающихся повышением температуры тела.

Способ применения: детям от 3 до 6 месяцев по 1 порошку 1–2 раза в течение суток; от 6 до 12 месяцев по 1 порошку 3–4 раза в течение суток; от 1 до 3 лет по 2 порошка 3 раза в течение суток. Принимать внутрь после еды. Размешать со столовой ложкой воды.

Противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность к ибупрофену или другим НПВП (в том числе ацетилсалициловой кислоте), а также к вспомогательным компонентам препарата; полное или неполное сочетание

бронхиальной астмы, эрозивно-язвенные заболевания органов ЖКТ; тяжелая почечная недостаточность, прогрессирующие заболевания почек, тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени.

Димедрол, ментол, новокаин, вазелин, раствор адреналина 0,1%, ланолин

Состав: димедрол, ментол, новокаин, вазелин, ланолин, р-р адреналина 0,1%.

Показания: гайморит, аллергический ринит, острый ринит.

Мазь сложная: папаверин, димедрол, эуфиллин, ланолин, масло подсолнечное, вода очищенная

Состав: папаверин, димедрол, эуфиллин, ланолин, масло подсолнечное, вода очищенная.

Показания: синусит, гайморит, ринит.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЧУВСТВ





Раствор рибофлавина 0,02%



Раствор альбуцида 10%, 30%



Раствор калия йодида 3%



Раствор борной кислоты 1-5%



Капли витаминные



Раствор колларгола 1%, 2%, 3%



Ушные капли



Рибофлавин, калия йодид, раствор глюкозы 2%



Капли от аллергии с димедролом



Раствор колларгола 1%, 2%, 3%



Раствор глюкозы 20%

Раствор рибофлавина 0,02% 10 мл

Обладает профилактическим действием при недостатке витамина B2.

Состав: рибофлавин 0,002; натрия хлорид 0,09; вода очищенная до 10,0.

Показания: в качестве профилактики куриной слепоты, язвы роговой оболочки, кератита, конъюнктивита, глаукомы, катаракты, блефарита, снижения остроты зрения. Препарат может использоваться при хронической усталости глаз вследствие длительного перенапряжения в результате долгого чтения или работы за компьютером.

Способ применения: по 1–2 капли в каждый глаз 2–3 раза в день.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, детский возраст до 18 лет.

Побочные действия: аллергические реакции на компоненты препарата, кратковременное нарушение зрения.

Раствор калия йодида 3% 10 мл

Средство антисептического действия для лечения различных заболеваний и патологий в области офтальмологии.

Состав: калия йодид 0,3; вода очищенная до 10,0.

Показания: катаракта различного типа; грибковые инфекции, локализующиеся в области роговицы и конъюнктивы; кровоизлияния в глазную оболочку; помутнение (поражение) стекловидного тела.

Способ применения: по 1–2 капли закапывать в конъюнктивальный мешок. Процедуру повторять 2–4 раза в день через одинаковые промежутки времени.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, детский возраст до 18 лет. Хроническая пиодермия лица, геморрагический диатез и нарушения функции щитовидной железы, диатез геморрагический, пиодермия кожи.

Побочные действия: легкое жжение сразу после закапывания, слезотечение, покраснение и раздражение глаз. При длительном сохранении побочных эффектов промыть глаза чистой проточной водой.

Капли витаминные

Состав: рибофлавин, глюкоза, кислота аскорбиновая, натрия хлорид, вода очищенная.

Показания: в качестве профилактики куриной слепоты, язвы роговой оболочки, кератита, конъюнктивита, глаукомы, катаракты, блефарита, снижения остроты зрения. Также препарат может использоваться при хронической усталости глаз вследствие длительного перенапряжения в результате долгого чтения или работы за компьютером.

Ушные капли 15 мл

Обладают антисептическим, антибактериальным и обезболивающим действием.

Состав: борная кислота спиртовой раствор 3% 15 мл; левомицетин 0,09; новокаин 0,09.

Показания: отит наружный (острый и хронический) без повреждения барабанной перепонки.

Способ применения: взрослым по 1–3 капли 2–3 раза в день. Курс лечения 3–5 дней.

Противопоказания: хроническая почечная недостаточность; перфорация барабанной перепонки; беременность; период лактации; детский возраст до 18 лет; индивидуальная непереносимость компонентов.

Побочное действие: зуд, жжение, гиперемия кожи наружного слухового прохода; аллергические реакции.

Капли от аллергии с димедролом 10 мл

Состав: димедрол 0,05 г; натрия хлорид 0,08 г; вода очищенная до 10 мл.

Показания: обострение сезонного или круглогодичного аллергического конъюнктивита; воспалительные состояния, связанные с раздражением конъюнктивы в результате применения контактных линз, воздействия солнечного света, табачного дыма, контакта с водой в плавательном бассейне. В качестве дополнительного средства при инфекционных заболеваниях глаз с острым отечным компонентом.

Способ применения: взрослым и детям старше 12 лет при острых симптомах — по 1 капле в конъюнктивальный мешок каждые 3 часа до уменьшения отека и раздражения глаз, затем — по 1 капле 2–3 раза в сутки до исчезновения клинических симптомов. Детям от 2 до 12 лет — 1–2 капли в сутки. Продолжительность лечения — не более 5 дней.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата; закрытоугольная глаукома; беременность и грудное вскармливание; детский возраст до 2 лет.

Побочные действия: сразу после закапывания могут возникнуть кратковременные побочные эффекты в виде легкого жжения, зуда, нарушения зрения, повышения внутриглазного давления, расширения зрачка, слезотечения и покраснения глаз, которые проходят самостоятельно и не требуют отмены препарата.

Раствор глюкозы 20%

Состав: глюкоза, вода очищенная.

Показания: в составе комплексной терапии катаракты, дистрофий роговицы и ретинопатии (с целью улучшения питания глазных тканей). Как средство рассасывающей терапии в виде ванночек для глаз. Для снятия отеков тканей глаза в период после офтальмологических операций. При неотложной помощи в офтальмологии.

Раствор альбуцида 10%, 30%

Состав: сульфацил натрия, вода очищенная.

Показания: конъюнктивит (включая бактериальные инфекции при конъюнктивите у детей), гнойные или язвенные поражения роговицы, блефарит, попадание в глаза инородных тел, хламидийные и гонорейные патологии органов зрения у взрослых, бленнорея у новорожденных.

Раствор борной кислоты 1—5%

Состав: борная кислота, вода очищенная.

Показания: конъюнктивит, острый и хронический отит, кольпит.

Раствор колларгола 1%, 2%, 3%

Состав: раствор колларгола, вода очищенная.

Показания: при затяжном насморке, гнойном рините.

Рибофлавин, калия йодид, раствор глюкозы 2%

Состав: рибофлавин, калия йодид, раствор глюкозы 2%.

Показания: увлажнение при сухости глаз, профилактика глаукомы и катаракты.

Раствор колларгола 1%, 2%, 3%

Состав: раствор колларгола, вода очищенная.

Показания: гнойные и вирусные конъюнктивиты, стрептококковые инфекции глаз.

ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ





Мазь для лечения геморроя



Масло для губ гигиеническое


Глюкоза


Раствор натрия гидрокарбоната 2—4%


Раствор формалина, формальдегида 1—40%


Мазь натрия хлорида 10%


Раствор натрия цитрата 3,8—6%


Раствор аскорбиновой кислоты


Раствор натрия тиосульфата 1—5%


Мазь анестезиновая


Порошок анестезина


Раствор спиртовой анестезина 10%


Раствор аммиакка 0,5%, 2%, 10%


Раствор калия йодида 0,25—8%


Раствор уксусной кислоты 1—6%


Раствор цинка сульфата 0,5—5%


Порошок эуфиллина


Раствор натрия хлорида 0,85—33%


Раствор глюкозы 25%


Раствор кальция глюконата 2,5—5%

Мазь для лечения геморроя 40 г

Оказывает противовоспалительное, обезболивающее, охлаждающее, подсушивающее, противозудное и ранозаживляющее действие.

Состав: вода очищенная 1 мл; новокаин 0,35; димедрол 0,35; ментол 0,35; ксероформ 3,5; цинка окись 3,5; вазелин 28,75, ланолин безводный 2,2.

Показания: симптоматическое лечение геморроя (анальный зуд; перианальная экзема и дерматит; геморрой; анальные трещины).

Способ применения: наружно. Перед применением кожу следует вымыть теплой водой и мягкой салфеткой (без мыла). Мазь наносить на пораженные участки кожи тонким слоем 2 раза в день.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, индивидуальная непереносимость, повреждения кожных покровов наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого применения препарата, беременность, лактация, детский возраст до 14 лет.

Побочное действие: возможны аллергические реакции.

Масло для губ гигиеническое 10 мл

Состав: настойка календулы, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло мелиссы.

Показания: масло оказывает противовирусное, подсушивающее, заживляющее и антисептическое действие. Настойка календулы обладает выраженным противомикробным, ранозаживляющим и противовоспалительным свойствами. Масло чайного дерева обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Эфирное масло мелиссы освежает, тонизирует, помогает снять воспаление и заживить раны.

Способ применения: наносить на проблемные участки кожи губ 4–5 раз в сутки.

Глюкоза 37,5 г

Применяют при проведении теста толерантности к глюкозе, когда содержание глюкозы в крови не позволяет установить диагноз нарушения толерантности к глюкозе или сахарного диабета.

Способ применения и дозы: исследуемые не менее чем за 3 дня до пробы должны соблюдать обычный режим питания (с содержанием углеводов не менее 150–200 г в сутки) и физических нагрузок. Первую пробу берут утром натощак, после ночного голодания в течение 10–14 часов (пить воду разрешается). После первого взятия крови из пальца исследуемый принимает 75 г глюкозы (2 флакона 37,5 г), растворенной в 250–500 мл воды в течение 2–5 минут. Для улучшения вкусовых качеств раствора и предотвращения тошноты у отдельных пациентов можно добавить сок лимона или лимонную кислоту. При проведении пробы у пациентов с избыточным весом глюкозу дают из расчета 1 г на 1 кг массы тела, но не более 100 г. Для детей количество глюкозы составляет 1,75 г на 1 кг массы тела, но не более 75 г. Через 2 часа определяется уровень глюкозы в крови.

Особые указания: пробу на толерантность к глюкозе следует проводить больному в спокойном состоянии, не должны предшествовать стрессовые ситуации или неадекватные нагрузки. Во время проведения исследования пациент должен спокойно сидеть (или лежать); курение, физические нагрузки недопустимы. Тест не рекомендуется проводить после изнурительных болезней, операций и родов, при воспалительных процессах, инфекционных заболеваниях, лихорадочном состоянии, алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях ЖКТ с нарушением всасывания глюкозы, злокачественных образованиях. Накануне и в день исследования необходимо отменить прием лекарств (адреналина, глюкокортикоидов, кофеина, диуретина, морфина, мочегонных тиазидного ряда, дифенина, психотропных средств и антидепрессантов), а также лечебные процедуры, которые могут повлиять на уровень глюкозы в крови. Ложноположительные результаты наблюдаются при гипокалиемии, дисфункции печени, эндокринопатиях.

Раствор натрия гидрокарбоната 2–4%

Состав: натрия гидрокарбонат, вода очищенная.

Показания: применяется в качестве антисептического средства при ожогах и ранах. Проведение ингаляций с помощью медицинских приборов: небулайзеров, ингаляторов.

Раствор формалина, формальдегида 1—40%

Состав: формальдегид 37%, вода очищенная.

Показания: для консервации биологических материалов.

Мазь натрия хлорида 10%

Состав: натрия хлорид, вазелин.

Показания: для обработки раневых поверхностей.

Раствор натрия цитрата 3,8—6%

Состав: натрия цитрат, вода очищенная.

Показания: для предотвращения свертывания крови в пробирке.

Раствор аскорбиновой кислоты

Состав: аскорбиновая кислота, вода очищенная.

Показания: для проведения электрофореза.

Раствор натрия тиосульфата 1—5%

Состав: натрия тиосульфат, вода очищенная.

Показания: для проведения электрофореза.

Мазь анестезиновая

Состав: вазелин, анестезин, вазелиновое масло.

Показания: местный анестетик для поверхностной анестезии. Препятствует возникновению болевых ощущений в окончаниях чувствительных нервов и проведению болевых импульсов по нервным волокнам.

Порошок анестезина

Состав: анестезин.

Показания: местный анестетик для поверхностной анестезии. Препятствует возникновению болевых ощущений в окончаниях чувствительных нервов и проведению болевых импульсов по нервным волокнам.

Раствор спиртовой анестезина 10%

Состав: анестезин, спирт этиловый 70%.

Показания: местный анестетик для поверхностной анестезии. Препятствует возникновению болевых ощущений в окончаниях чувствительных нервов и проведению болевых импульсов по нервным волокнам.

Раствор аммиака 0,5%, 2%, 10%

Состав: аммиак 10%, вода очищенная.

Показания: применяется как средство скорой помощи при обморочных состояниях. В хирургической практике для мытья рук, а также для нейтрализации кислых токсинов и при укусах насекомых и змей.

Раствор калия йодида 0,25—8%

Состав: калия йодид, вода очищенная.

Показания: для проведения электрофореза. Внутреннее применение для профилактики и лечения эндемического зоба.

Раствор уксусной кислоты 1—6%

Состав: уксусная кислота 75%, вода очищенная.

Показания: при проведении кольпоскопии для выявления рака шейки матки. В комплексной терапии при лечении инфекционных заболеваний кожи, ногтей.

Раствор цинка сульфата 0,5—5%

Состав: цинка сульфат, вода очищенная.

Показания: конъюнктивит, ларингит, уретрит, вагинит — местно.

Порошок эуфиллина

Состав: эуфиллин.

Показания: бронхообструктивный синдром любого генеза; бронхиальная астма; хроническая обструктивная болезнь легких; гипертензия в малом круге кровообращения; «легочное» сердце; ночное апноэ.

Раствор натрия хлорида 0,85—33% стерильный

Состав: натрия хлорид, вода очищенная.

Показания: для проведения ингаляций с помощью медицинских приборов — небулайзеров, ингаляторов. Раствор натрия хлорида 10%: для обработки раневых поверхностей.

Раствор глюкозы 25%

Состав: глюкоза, вода очищенная.

Показания: физиологическая и патологическая желтуха; гипогликемия новорожденного; недостаточное количество материнского молока; интоксикация организма; родовые травмы; асфиксия — кислородное голодание; рождение недоношенного младенца.

Раствор кальция глюконата 2,5—5%

Состав: кальция глюконат, вода очищенная.

Показания: для электрофореза при заболеваниях, сопровождающихся дефицитом кальция в организме.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЙ ПОЛОСТИ РТА





Болтушка стоматологическая 27,5 г



Средство для полости рта при воспалении 250 мл

Болтушка стоматологическая 27,5 г

Обладает местноанестезирующим, антибактериальным действием.

Состав: глицерин 25,0; анестезин 1,25; стрептоцид 1,25.

Показания: стоматит различный этиологии, хейлит, гингивит, пародонтит, повреждение слизистой оболочки полости рта при ношении зубных протезов, травмы слизистой оболочки полости рта.

Способ применения: взрослым и детям с 1 года наносить на пораженные участки стерильной салфеткой 3–4 раза в день. Перед применением взбалтывать.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов.

Средство для полости рта при воспалении 250 мл

Оказывает обезболивающее, подсушивающее и ранозаживляющее действие.

Состав: масло мяты перечной 0,05; танин 2,5; резорцин 2,5; вода очищенная до 250 мл.

Показания: в качестве симптоматического средства для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта, зева, гортани, санации ротовой полости в период эпидемии ОРВИ.

Способ применения: местно. Полоскать полость рта 2 раза в день в течение 10–30 секунд неразбавленным раствором. Можно также смазывать слизистую оболочку полости рта с помощью ватного тампона на палочке. Препарат следует применять после еды или в промежутках между приемами пищи.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата, индивидуальная непереносимость, детский возраст до 12 лет.

Побочное действие: возможны аллергические реакции.

Производственные аптеки:

- Аптека №4, г. Красноярск, ул. Декабристов, 36
- Аптека №200 г. Красноярск, ул. Мичурина, 33
- Аптека №344, г. Красноярск, ул. Яковлева, 59
- Аптека №323, г. Красноярск, ул. имени газеты «Пионерская правда», 8
- Аптека №330, г. Норильск, ул. Павлова, 19

Данный рекламный материал предназначен только для распространения в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий для медицинских и фармацевтических работников.

Лицензия №ЛО42-01019-24/00590063
от 16.12.2020

Год выпуска каталога: 2025

ГУБЕРНСКИЕАПТЕКИ.РФ